

形 式：皮膚がん：MMCQ15-2

一次研究用フォーム		データ記入欄	
基本情報	対象疾患	皮膚悪性腫瘍	
	タイプ	メラノーマ	
タイトル情報	論文の英語タイトル	High- and low-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma: First analysis of intergroup trial E1690/S9111/C9190.	
	論文の日本語タイトル	ハイリスクメラノーマにおける高および低用量インターフェロンアルファ 2b：グループ内トライアル E1690/S9111/C9190 の初回分析	
診療ガイドライン情報	ガイドラインでの引用有無	1.有り 2.無し (1)	
	ガイドライン上での目次名称	MMCQ15-2	
書誌情報	エビデンスのレベル分類	I. システマティック・レビュー／メタアナリシス II. 1 つ以上のランダム化比較試験 III. 非ランダム化比較試験 IV. 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究） V. 記述研究（症例報告やケースシリーズ） VI. 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見 (II)	
	Pubmed ID		
	医中誌 ID		
	雑誌名	J. Clin. Oncol.	
	雑誌 ID		
	巻	18	
	号		
	ページ	2444-2458	
	ISSN ナンバー		
	雑誌分野	1.医学 2.歯学 3.看護 4.その他 (1)	
	原本言語	1.日本語 2.英語 3.ドイツ語 4.その他 (2)	
	発行年月	2000	
	著者情報		氏名
筆頭著者		Kirkwood JM	Dept. of Pathology, Univ. of Pittsburgh Medical Center, U.S.A.
その他著者 1		Ibrahim JG	
その他著者 2		Sondak VK	
その他著者 3		Richards J	
その他著者 4		Flaherty LE	
その他著者 5		Ernstoff MS	
その他著者 6		Smith TJ	
その他著者 7		Rao U	
その他著者 8		Steel M	
その他著者 9		Blum RH	
その他著者 10			

一次研究の 8 項目	目的	ハイリスクの皮膚悪性黒色腫患者において、術後補助療法としてのインターフェロンアルファ 2b の高用量投与を、全生存期間および無病生存期間について、非投与群と比較検討する	
	研究デザイン	ランダム化比較試験	
	セッティング	ECOG 施設	
	対象者	ハイリスクの皮膚悪性黒色腫患者 642 例	
	対象者情報（国籍）	1.日本人 2.日本人以外 3.国籍区別せず （ 3 ）	
	対象者情報（性別）	1.男性 2.女性 3.男女区別せず （ 3 ）	
	対象者情報（年齢）	1.乳幼児 2.小児 3.青年 4.中高年 5.老人 6.乳幼児・小児 7.乳幼児・小児・青年 8.乳幼児・小児・青年・中高年 9.乳幼児・小児・青年・中高年・老人 10.小児・青年 11.小児・青年・中高年 12.小児・青年・中高年・老人 13.青年・中高年 14.青年・中高年・老人 15.中高年・老人 16.乳幼児・青年 17.乳幼児・中高年 18.乳幼児・老人 19.小児・中高年 20.小児・老人 21.青年・老人 22.年齢区別せず （ 22 ）	
	介入（要因曝露）		
	エンドポイント（アウトカム）	エンドポイント	区分
	1	全生存期間	1.主要 2.副次 3.その他（ 1 ）
	2	無病生存期間	1.主要 2.副次 3.その他（ 1 ）
	3		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	4		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	5		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	6		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	7		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	8		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	9		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	10		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	主な結果	無再発 5 年生存率には有意差が認められた（44%対 35%）が、全生存期間に有意差は検出されなかった。	
	結論	ハイリスクの皮膚悪性黒色腫患者において、術後補助療法としてのインターフェロンアルファ 2b の高用量投与は、無病生存期間の改善に役立つ。	
	備考		
レビューワーコメント	レビューワー氏名	山本明史	
	レビューワーコメント	エビデンスのレベル分類（ II ）	