レビュー研究用フォーム		データ記入欄	
基本情報	対象疾患	悪性黒色腫	
	タイプ		
タイトル情報	論文の英語タイトル	Treatment of metastatic malignant melanoma with dacarbazine plus tamoxifen	
	論文の日本語タイトル		
診療ガイドライン情報	ガイドラインでの引用有無	1.有り 2.無し (1)	
	ガイドライン上での目次名称	C Q20-4	
書誌情報	エビデンスのレベル分類	I. システマティック・レビュー／メタアナリシス II. 1つ以上のランダム化比較試験による III. 非ランダム化比較試験による IV. 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究による） V. 記述研究（症例報告やケースシリーズによる） VI. 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見 (II)	
	Pubmed ID		
	医中誌 ID		
	雑誌名	N Engl J Med	
	雑誌 ID		
	巻	327	
	号	8	
	ページ		
	ISSN ナンバー	0028-4793 (Print)	
	雑誌分野	1.医学 2.歯学 3.看護 4.その他 ()	
	原本言語	1.日本語 2.英語 3.ドイツ語 4.その他 ()	
	発行年月	1992	
	著者情報		氏名
筆頭著者		Cocconi G	Italian Oncology Group for Clinical Research, Ospedale Maggiore, Parma.
その他著者 1		Bella M	
その他著者 2		Calabresi F	
その他著者 3		Tonato M	
その他著者 4		Canaletti R	
その他著者 5		Boni C	
その他著者 6			
その他著者 7			
その他著者 8			
その他著者 9			
その他著者 10			

レビュー研究の6項目	目的	DTIC 単剤に対するタモキシフェンの併用効果を調べる。
	データソース	
	研究の選択	
	データ抽出	
	主な結果	<p>117 例</p> <p>DTIC 単剤：奏効率 12%、生存期間 29 週</p> <p>DTIC 単剤+タモキシフェン：奏効率 28%、生存期間 48 週</p> <p>で統計学的にタモキシフェンの併用効果あり。</p> <p>この優位性は、DTIC 単剤+タモキシフェンを投与された女性群ではみとめられたが、DTIC 単剤+タモキシフェンを投与された男性群にはなく、また、DTIC 単剤群には性差は認められなかった。</p>
結論	DTIC 単剤+タモキシフェンはDTIC 単剤より有効であり、また、その差は女性患者にみられる。	
	備考	
レビューワーコメント	レビューワー氏名	宇原
	レビューワーコメント	<p>エビデンスのレベル分類 (I I)</p> <p>女性ホルモンが悪性黒色腫の進行に関与しているかもしれないという仮説のもとに検証された試験である。</p>